

## Fütterungsempfehlungen für die Mast von Nachkommen aus PIC-Hybridsau (Camborough/Camborough 25/Camborough 29) x PIC-Piétrain<sup>426</sup> (NP/PP)

### ZWEIPHASIGE Mast

ZIEL (für die gemischtgeschlechtliche Gruppe):

Muskelfleischanteil: 56,5 % / 0,98 IXP/kg SG - Tageszunahmen: 800 g – Futterverzehr: 2,4 kg/Tag

#### SAUEN

Mast woche	Lebend- gewicht, kg	Tages- zunahmen, g	Energie- aufnahme, MJ ME	Futtermenge, kg 13,4 MJ ME 1,1 % Lysin	Futtermenge, kg 12,6 MJ ME 0,9 % Lysin
1	27,0 – 32,4	770	20,1	1,50	
2	32,4 – 38,3	840	22,1	1,65	
3	38,3 – 44,4	870	24,0	1,79	
4	44,4 – 50,6	880	26,5	1,98	
5	50,6 – 56,8	890	27,8	2,07	
6	56,8 – 63,1	900	29,2	2,18	
7	63,1 – 69,4	900	30,3	2,26	
8	69,4 – 75,6	880	31,6		2,51
9	75,6 – 81,6	860	32,9		2,61
10	81,6 – 87,3	820	35,2		2,79
11	87,3 – 92,8	790	36,5		2,90
12	92,8 – 98,2	770	36,5		2,90
13	98,2 – 103,4	750	36,5		2,90
14	103,4 – 108,5	730	36,5		2,90
15	108,5 – 113,5	710	36,5		2,90

#### BÖRGE

Mast woche	Lebend- gewicht, kg	Tages- zunahmen, g	Energie- aufnahme, MJ ME	Futtermenge, kg 13,4 MJ ME 1,1 % Lysin	Futtermenge, kg 12,6 MJ ME 0,9 % Lysin
1	27,0 - 32,4	770	20,1	1,50	
2	32,4 - 38,3	840	22,8	1,70	
3	38,3 - 44,4	870	25,5	1,90	
4	44,4 - 50,6	890	28,1	2,10	
5	50,6 - 56,9	900	29,5	2,20	
6	56,9 - 63,3	910	30,8	2,30	
7	63,3 - 69,7	910	31,5		2,50
8	69,7 - 75,8	870	32,8		2,60
9	75,8 - 81,5	820	32,8		2,60
10	81,5 - 87,0	785	34,0		2,70
11	87,0 - 92,4	770	34,0		2,70
12	92,4 - 97,6	740	34,0		2,70
13	97,6 - 102,6	715	35,3		2,80
14	102,6 - 107,5	700	35,3		2,80
15	107,5 - 112,1	660	35,3		2,80

Stand: Januar 2009